South Central District Health
Keeping your family and community healthy
1020 Washington Street N • Twin Falls, ID 83301
(208) 734-5900 Ext. 239

PROFILAXIS PARA LA PLAGA

DEPENDIENDO DE SU EDAD, PESO Y CONDICIONES MEDICAS PREEXISTENTES, SUS ANTIBIÓTICOS PUEDEN VARIAR DE ÉSOS ENUMERADOS ABAJO.

Adultos:

- Doxycycline: 100mg píldoras dos veces al día por 7 días
  O
- Ciprofloxacin: 500mg píldoras dos veces al día por 7 días

Tratamiento Alternativo:
- Chloramphenicol: 25mg píldoras 4 veces al día por 7 días

Niños:

- Doxycycline píldoras dos veces al día por 7 días (la dosis exacta depende del peso del niño)
  O
- Ciprofloxacin: 20mg píldoras dos veces al día por 7 días

Tratamiento Alternativo:
- Chloramphenicol: 25mg tabletas 4 veces al día por 7 días

Mujeres Embarazadas:

- Doxycycline: 100mg píldoras dos veces al día por 7 días
  O
- Ciprofloxacin: 500mg píldoras dos veces al día por 7 días

Tratamiento Alternativo:
- Chloramphenicol: 25mg píldoras 4 veces al día por 7 días

USTED DEBE TOMAR TODA LA MEDICACIÓN DURANTE EL PERÍODO RECOMENDADO.

SI USTED EXPERIMENTA ALGUNA SÍNTOMA, PONGASE EN CONTACTO CON UN PROVEEDOR DEL CUIDADO MÉDICO *INMEDIATAMENTE.*